PISA AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.
PROYECTO DE MARBETE PARA EL FRASCO DE:
FOSFODICA *Solución Oral* USO VETERINARIO

FORMULA:
Cada 100 ml contienen:

Fosfomicina disódica	10 g
Vehículo cbp	100 ml

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica

LOTE No:

FECHA DE CADUCIDAD:
Registros en otros países:

Contenido neto: 1 L, 4 L, 20 L

FOSFODICA

Reg. S.A.G.A.R.P.A.
Q-7833-140

USO VETERINARIO

Antimicrobiano de amplio espectro
y efecto bactericida

Fosfomicina disódica 10%

Solución Oral

(LOGO PISA® AGROPECUARIA)
®Marca Registrada

HECHO EN MEXICO POR:
PiSA Agropecuaria, S.A. de C.V.
Calle 1 Norte, Manzana 2-25
Parque Industrial Tula
Atitalaquia, Hgo.

INDICACIONES:
FOSFODICA es una solución para uso oral que contiene un antimicrobiano de amplio espectro y efecto bactericida, indicado para el tratamiento de enfermedades de aves (reproductoras pesadas y ligeras en desarrollo, pollo de engorda), pavos y cerdos causadas por bacterias susceptibles a la fosfomicina.
Aves: Coriza infecciosa, colibacilosis, enfermedad respiratoria crónica (ERC), salmonelosis, tifoidea aviar, cólera aviar, artritis bacterianas, etc.
Cerdos: Complejo respiratorio porcino, colibacilosis, salmonelosis, artritis bacterianas, erisipela, infecciones intestinales en general, cistitis, pielonefritis, metritis o endometritis postparto.

DOSIS:
Aplique en el agua de bebida 1 ml/10 kg de peso vivo equivalente a 10 mg de ingrediente activo por kg de peso (1 a 2 ml/L de agua de bebida), durante 3 a 5 días consecutivos.
En aves se recomienda la aplicación en terapia de choque, utilizando la cantidad total de producto a consumir en un día en el agua que las aves beberán en 3 a 5 horas, repetir por 3-5 días consecutivos.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral, en el agua de bebida.

ADVERTENCIAS:
- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C.
- No se deje al alcance de los niños.
- No deberá usarse este producto 10 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.
- El huevo de las aves tratadas no deberá consumirse hasta 5 días después del último tratamiento.
- Se recomienda no utilizar ningún acidificante durante la administración del producto ya que esto puede interferir con su efectividad.