

VETERINARIO

Contenido neto: Frasco con 50 ml

FORMULA:

Cada 5 ml contienen:

Gonadorelina acetato

equivalente a

500

mcg

de Gonadorelina

Vehículo cbp

5

ml

RELINA500

Reg. S.A.G.A.R.P.A.

Q-7833-218

USO VETERINARIO

Hormona inductora de la ovulación

Gonadorelina

Solución Inyectable

CONSULTE AL MEDICO
VETERINARIO

**Su venta requiere receta médica cuantificada
Para uso exclusivo del médico veterinario**

(LOGO PISA®AGROPECUARIA)

®Marca Registrada

LOTE No:

HECHO EN MEXICO PARA:
PiSA Agropecuaria, S.A. de C.V.
Calle 1 Norte, Manzana 2-25
Parque Industrial Tula
Atitalaquia, Hgo.

FECHA DE CADUCIDAD:

Registros en otros países:

INDICACIONES:

RELINA500: Controla la producción y secreción de la hormona luteinizante (LH) y de la hormona folículo estimulante (FSH) en bovinos (carne y leche) y conejas. En bovinos usar en el momento de la inseminación artificial para inducir la ovulación y mejorar la tasa de concepción; aplicándola 12 o 14 días posparto mejora la fertilidad en el puerperio. También se usa en el tratamiento de quistes ováricos. En conejas: se usa para la inducción de la ovulación en la inseminación artificial.

DOSIS:

BOVINOS

Tratamiento de quistes ováricos 5.0 ml

Retraso en la ovulación 2.5 ml

Reinicio de la actividad ovárica en el período de posparto 2.5 ml

Sincronización de la ovulación en los programas de inseminación a tiempo fijo (programa de Ovsynch). 1.0 ml

CONEJAS

Inducción de la ovulación 0.2 ml

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular.

TIEMPO DE RETIRO:

La carne o leche de los animales tratados , no precisan ningún periodo de retiro.

ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Consérvese en refrigeración y protegido de la luz
- No debe utilizarse en hembras preñadas.
- Una vez abierto el envase, el producto se mantiene estable durante un mes protegido de la luz y en refrigeración