

SEBENDAZOL® 4%



FENBENDAZOL

POLVO ORAL

Aditivos para el alimento premezclas

FORMULA:

Cada g contiene:

Fenbendazol	40 mg
Excipiente cbp	1 g

Contenido neto: 25 kg

USO VETERINARIO:



CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica.

INDICACIONES:

SEBENDAZOL® 4% es un desparasitante de amplio espectro y alta efectividad contraparasitos gastrointestinales, pulmonares y renales (en todas sus fases evolutivas) que afectan al ganado porcino. También actúa contra los parásitos frecuentes que afectan a las aves de engorda tales como: *Ascaridia sp.*, *Heterakis sp.*, *Capillaria sp.*, *Raillietina spp* y *Syngamus trachea*. Sebendazol® 4% es efectivo contra los parásitos adultos e inclusive actúa en las fases juveniles (larvas). Este medicamento carece de efectos que depriman la producción del animal, por lo que se puede administrar sin riesgo a hembras gestantes próximas a parto o durante la lactancia.

DOSIS:

PORCINOS:

Tratamiento de un día: 2.50 kg de SEBENDAZOL® 4% por tonelada de alimento terminado, lo que equivale a 5 mg/kg de peso vivo o 100 ppm de fenbendazol.

Tratamiento de 5 días: 500 g de SEBENDAZOL® 4% por tonelada de alimento terminado, lo que equivale a 20 ppm de fenbendazol.

Tratamiento de 10 días: 250 g de SEBENDAZOL® 4% por tonelada de alimento terminado, lo que equivale a 10 ppm de fenbendazol.

Tratamiento continuo durante todo el periodo de engorda, empezando después del destete: 150 g de SEBENDAZOL® 4% por tonelada de alimento terminado, lo que equivale a 6 ppm de fenbendazol.

En infestaciones por *Stephanurus dentatus*, la dosificación se aumentará al doble (10 mg/kg de peso vivo durante un día).

Para el tratamiento de *Cysticercus cellulosae*, se recomienda el tratamiento con 5 mg/kg de peso vivo durante 7 días consecutivos.

AVES DE ENGORDA:

1.5 kg de SEBENDAZOL® 4% por tonelada de alimento durante 3 días consecutivos (60 ppm de fenbendazol).

750 g de SEBENDAZOL® 4% por tonelada de alimento durante 5 días consecutivos (30 ppm de fenbendazol).



Reg. SAGARPA Q-7833-072

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30 C en un lugar seco.
- No se deje al alcance de los niños.
- No utilizar este producto 15 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.
- No utilizar este producto en aves productoras de huevo.
- Consérvese en lugar fresco, seco y protegido de la luz.

Salud animal
Bienestar humano®