

**FORMULA:**

Hecha la mezcla cada 100 ml contienen:

Amoxicilina trihidratada equivalente a de amoxicilina	4.000 g
Clavulanato de potasio equivalente a de Acido Clavulánico	0.5714 g
Vehículo cbp	100 ml

Cada 5 ml equivalen a 200 mg de Amoxicilina y  
28.57 mg de ácido Clavulánico.

CONSULTE AL MEDICO  
VETERINARIO

**Su venta requiere receta médica**

LOTE No:

FECHA DE CADUCIDAD:

**Registros en otros países:**

-

Contenido neto: Frasco con polvo para 50 ml  
Frasco con polvo para 70 ml

## AMOXICLAV VET

Reg. S.A.G.A.R.P.A.  
Q-7833-217

### USO VETERINARIO

Antibiótico

**Amoxicilina/Ácido Clavulánico**

Suspensión Oral

(LOGO PISA® AGROPECUARIA)  
®Marca Registrada

HECHO EN MEXICO PARA:  
PiSA Agropecuaria, S.A. de C.V.  
Calle 1 Norte, Manzana 2-25  
Parque Industrial Tula  
Atitalaquia, Hgo.

### INDICACIONES:

**AMOXICLAV VET:** Indicado para el tratamiento de infecciones agudas y crónicas causadas por microorganismos tanto Gram positivos como Gram negativos; aerobios y anaerobios, productores y no productores de betalactamasas y algunos resistentes a penicilina, ampicilina y Amoxicilina sola. En general para el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles en perros y gatos.

### DOSIS:

**Perros:** 12.5 a 25 mg/kg cada 12 horas. En infecciones por Gram negativos se recomienda usar la dosis más alta (0.3 a 0.62 ml/kg).

- Para problemas de piel 12.5 mg/kg de peso cada 12 horas de 14 a 120 días. (1 ml/3kg)

- Para infecciones sistémicas bacterianas 22 mg/kg de 8 a 12 horas por 7 días. (0.5 ml/kg)

**Gatos:** de 10 - 20 mg/kg cada 12 horas. (0.25 a 0.5 ml/kg) En infecciones por Gram negativos se recomienda usar la dosis más alta.

- Para infecciones de piel o tejidos blandos se recomienda 62.5mg/gato (dosis total 1.6 ml) o 10 a 20 mg/kg (0.25 a 0.5 ml/kg) cada 12 horas de 5-7 días.

- En sepsis o neumonía de 10 a 20 mg/kg (0.25 a 0.5 ml/kg) vía oral por 7 a 10 días.

### VIA DE ADMINISTRACION:

Oral.

*Leer instructivo anexo.*

### ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C.
- Hecha la mezcla el producto se conserva durante 7 días en refrigeración entre 2°-8 °C. No se congele.
- No se deje al alcance de los niños.
- Aflójese el polvo, golpeando suavemente el frasco por los dos lados.
- Agregar agua potable, agítese para formar una suspensión homogénea y vuélvase a añadir agua hasta la marca. Agítese antes de usarse.
- El uso de este producto esta contraindicado en animales con historia de reacción alérgica a las penicilinas o cefalosporinas.
- En caso de reacción alérgica administrar epinefrina y/o esteroides