



**FIST® GEL**

Registro Único: RSCO-DOM-INAC-174-309-092-0.05

Cucarachicida


**DESCRIPCIÓN:**

**FIST® GEL** es un cucarachicida perteneciente al grupo de Lactonas Macrociclicas el cual está fabricado con los más altos estándares de calidad, formulado como cebo en gel. **FIST® GEL** es un producto diseñado para el control de cucarachas en general para el uso en casas, hospitales, laboratorios, explotaciones pecuarias, bodegas, jardines, escuelas, áreas de alimentos, etc. **FIST® GEL** trabaja con un excelente efecto residual que contiene potentes atrayentes específicos para cucarachas. **FIST® GEL** es fácil de aplicar pues se adapta a cualquier tipo de superficie ya sea lisa o áspera. **FIST® GEL** es muy seguro por sus ingredientes de origen natural. No se endurece como otros productos disponibles en el mercado.

**FÓRMULA:**

Abamectina: no menos del 0.05%  
Vehiculo cbp no más de 99.95%

Fórmula estructural de la Abamectina:



**MODO DE ACCIÓN:**

Abamectina:

Actúa por ingestión. Estimula la liberación del Ácido Gamma Amino Butírico (GABA) en los artrópodos inhibiendo la transmisión neuro-muscular. Los insectos y ácaros sensibles a la Abamectina son paralizados y mueren. Tiene un efecto retardado sobre la cucaracha permitiéndole llegar a su área de agregación y se lleve a cabo el efecto dominó.

**INSTRUCCIONES DE USO:**

Aplique 1 cm<sup>3</sup> por cada m<sup>2</sup> en los lugares donde tenga problemas, en lugares con infestaciones severas se recomienda no menos de 10 puntos por m<sup>2</sup>.

**DOSIS:**

La cantidad de producto a utilizar se muestra en el cuadro 1.

Método para preparar y aplicar el producto:

El producto está listo para su uso.

Sin embargo tome en cuenta lo siguiente: **FIST® GEL** se utiliza en aplicaciones únicas o bien como parte de un programa de control integral. El programa debe incluir medidas sanitarias, entre ellas la protección de reservas alimenticias, eliminación adecuada de la basura y reparación de daños estructurales como grietas y hendiduras para evitar que las plagas encuentren sitios de refugio.

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:**

Antes de iniciar el tratamiento se recomienda realizar una buena inspección, para evaluar el grado de infestación; si después de aplicado y al realizar una evaluación el gel ha sido consumida en su totalidad y las cucarachas están todavía presentes.

Será necesario reemplazar los cebos viejos; si el gel esta aún presente sin haber sido consumido, la





Salud animal  
Bienestar humano®

# FICHA TÉCNICA

## Control de Vectores

infestación esta eliminada o bien es necesario elegir nuevos sitios de cebo.

### TIEMPO DE REENTRADA:

No es necesario esperar para entrar a los lugares tratados ya que las aplicaciones de **FIST® GEL** se realizan en forma selectiva, sin preparación previa ni uso de aspersores, evitando olores y vapores.

### ADVERTENCIAS:

No coma, beba o fume durante la aplicación del producto.

Deje el producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

No reutilice el envase.

### PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación lleve al paciente con el médico y muéstrela esta etiqueta.

Contacte al servicio SINTOX DE AMIFAC 55-98-66-59, 56- 11-26-34 y lada sin costo 01-800-00-928-00.

### PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE:

Este producto es tóxico a los peces, abejas y fauna silvestre.

### GARANTÍA:

El fabricante garantiza que dicho producto esta compuesto por los ingredientes que se especifican. El fabricante y sus distribuidores no aceptan responsabilidad alguna por daños a personas o daños a la propiedad ajena que pudieran resultar de su uso si no se cumple de acuerdo a las instrucciones.

### PRESENTACIONES:

Jeringa con 30g.

Caja con 24 jeringas

### DISTRIBUIDO POR:

PiSA Agropecuaria S.A. de C.V.

Av. España 1840

Colonia Moderna

Guadalajara, Jalisco México.

CP. 44190

Consulte a su Médico Veterinario.

### Responsables del contenido:

Departamento Técnico, PiSA Agropecuaria S.A. de C.V.

